

岐阜県（ススキ、チカラシバ、ヨモギ、イタドリを混播）



施工2ヵ月後



7ヵ月後

愛知県（ススキ、チカラシバのほか、木本類を混播）



施工直後



7ヵ月後

福岡県（ススキ、カゼクサ、アキノエノコログサのほか、木本類を混播）



施工直後



7ヵ月後

純・国内産の在来草本による 原風景緑化工法



純・国内産の在来草本種子を使用して、
地域生態系と生物多様性に配慮した法面緑化を実現します。

特長

- ◆ 外来牧草類と変わらないスピーディーな全面緑化が可能です。
- ◆ 法面が野生シカなどの餌場になるリスクを大きく低減できます。
- ◆ 植物の発芽生育に適した高品質な生育基盤を造成できます。



1ヵ月後(ススキとチカラシバを主体に導入)



2ヵ月後



1年5ヵ月後

原風景緑化工法と外来牧草類を導入した植生基材吹付工の比較

原風景緑化工法



シカ不嗜好性の国内産在来種の使用により、
全面緑化されています。

外来牧草類を導入した植生基材吹付工



外来牧草の法面はシカの餌場となり、
生育基盤も全面的に踏み荒らされています。

オリジナル資材

- ◆ オルガソイルは、良質なバーク堆肥にピートモスを混合した有機質系生育基盤材です。
- ◆ レミコントロールは、植物の発芽生育に悪影響を与えず、高い耐侵食性を発揮します。

配合表

材 料	品名・規格	数 量
生育基盤材	オルガソイル	2,000L
侵食防止材	レミコントロール	60kg
緩効性肥料	ハイコントロール650	4kg
国内産在来草本種子	RS計量袋詰種子	10袋



純・国内産の在来種子の供給体制 (RSセンター)

- ◆ 国内在来種子を供給するRSセンター(種子専用貯蔵施設)を保有
- ◆ 種子配合設計に基づいて種子を正確に計量・袋詰めした製品を現場に出荷
- ◆ 発芽率を1週間前後で試験できる早期発芽力検定法で品質証明



RSセンター



RS計量袋詰種子




チカラシバの播種7日後の比較

純・国内産の在来草本類の一例

ススキ

土工指針

シカ対策




形態等	耐瘦地	耐乾性	耐陰性	耐暑性	耐寒性	耐酸性
多年草	◎	◎	△	◎	○	◎

草丈：100～200cm ●イネ科 ●分布：日本全土

チカラシバ

土工指針

シカ対策






形態等	耐瘦地	耐乾性	耐陰性	耐暑性	耐寒性	耐酸性
多年草	○	◎	△	○	○	○

草丈：30～80cm ●イネ科 ●分布：日本全土

カゼクサ

土工指針

シカ対策






形態等	耐瘦地	耐乾性	耐陰性	耐暑性	耐寒性	耐酸性
多年草	○	◎	△	○	△	○

草丈：30～80cm ●イネ科 ●分布：本州～九州

アキノエノコログサ

土工指針

シカ対策





形態等	耐瘦地	耐乾性	耐陰性	耐暑性	耐寒性	耐酸性
一年草	○	◎	△	○	○	○

草丈：50～80cm ●イネ科 ●分布：日本全土

イタドリ

土工指針

シカ対策



草丈：20～100cm ●イネ科 ●分布：北海道～九州

※イラストは平均草丈を示したもので、実際の草丈は現場の立地条件等により異なります。